



PansenReaktiv®-Bolos

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe

Zur Verringerung der Gefahr der Acidose

MIT
LEBENDHEFE



Levucell® sind lebende Hefen, die das Wachstum Faser verwerdender und Lactat abbauender Mikroorganismen im Pansen stimulieren, während Lactat bildende Bakterien gehemmt werden. Dadurch wird die Faserverwertung verbessert und der pH-Wert stabilisiert.

Calcium mobilisiert die Pansen-Motorik und trägt zur Deckung des erhöhten Calciumbedarfs in der Laktation bei.

Natriumbicarbonat ist ein effektiver Puffer zur schnellen Anhebung des Pansen pH-Wertes.

Magnesiumoxid ist ein Säureregulator, der zur Normalisierung des Pansen-pH-Wertes beiträgt.



PansenReaktiv®-Bolos ist ein Pansenstimulans zur Stabilisierung der Pansenflora und zur schnellen Pufferung bei Pansenacidose und nutritiven Imbalancen. Die Lebendhefe Levucell® SC fördert das Wachstum der cellulosespaltenden Pansenflora und die Faserverwertung. Calcium und Magnesium sichern darüber hinaus eine optimale Versorgung mit essentiellen Mineralstoffen.

Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:
Niedriger Gehalt an leicht vergärbaren Kohlenhydraten, hohe Pufferkapazität

Zusammensetzung:
Natriumbicarbonat 25 %, Monoammoniumphosphat, Magnesiumoxid 10 %, Milchpulver, Traubenzucker

Analytische Bestandteile:

Rohasche	54,9 %	Rohfaser	2,6 %
Rohfett	0,9 %	Rohprotein	14,2 %
Natrium	8,9 %	Calcium	8,1 %
Phosphor	4,6 %	Magnesium	4,6 %
Stärke	0 %	Gesamtzucker	6,5 %

Zusatzstoffe pro kg:

Mikroorganismen:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077

[Levucell® SC 10 ME Titan] [4b1711]

10 x 10¹⁰ KBE

Technologische Zusatzstoffe:

Ameisensäure aus Calciumformiat [1a238]	163.100 mg
Propionsäure aus Calciumpropionat [1k282]	39.683 mg
Propionsäure aus Natriumpropionat [1k281]	38.462 mg

Fütterungsempfehlung:

Milchkühe: 2 Boli pro Tier / Tag

Empfohlene Fütterungsdauer:

2 Tage. Insbesondere für Hochleistungskühe.

Fütterungshinweise:

In der Futtermittellagerung ist ein genügend hoher Fasergehalt gegenüber leicht vergärbaren Kohlenhydraten einzuhalten. Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist.

Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Nicht über 25 °C und trocken lagern!

QS-ID: 4953113131521

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform:

4 x 110 g

40 x 110 g

