



DiarPositiv® PRO

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen

Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms

MIT NATRIUM-
BUTYRAT



Butyrat ist eine wichtige Energiequelle für Zellen der Darmschleimhaut und trägt zur Stärkung der Darmbarriere bei.

Enterococcus faecium ist ein probiotisches, Milchsäure produzierendes Bakterium, das als lebender Mikroorganismus zur Stabilisierung der Darmflora beiträgt.

Präbiotische Fructo-Oligosaccharide dienen als Nährstoffe für das Wachstum der erwünschten Mikroorganismen im Darm und tragen so zur Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora bei.

Bentonit ist ein Tonmineral mit starker Quellfähigkeit und hohem Wasserbindungsvermögen.



Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Hoher Elektrolytgehalt, leicht verdauliche Einzelfuttermittel (Hefen, Malz).

Zusammensetzung:

Pflanzliche Öle und Fette, Malz, Fructo-Oligosaccharide 5 %, Hefenerzeugnisse, Natriumbutyrat 0,6 %, Mineralstoffe, Hefen, Natriumchlorid, Kaliumchlorid

Analytische Bestandteile:

Rohprotein	1,5 %	Rohfaser	0,4 %
Rohfett	42 %	Rohasche	34,3 %
Natrium	0,9 %	Kalium	0,3 %

Zusatzstoffe pro 1000 ml:

Darmflorastabilisator:

Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 2 x 10¹¹ KBE

Technologische Zusatzstoffe:

Bentonit	304.000 mg
Natriumpropionat	2.000 mg

Fütterungsempfehlung:

Bei und nach akutem Durchfall. Zur Verabreichung über das Futter oder direkt in das Maul.

Bei einem Gewicht

bis	5 kg	2 x täglich	1 ml
von	> 5 - 10 kg	2 x täglich	2 ml
von	> 10 - 25 kg	2 x täglich	4 ml
von	> 25 - 40 kg	2 x täglich	6 ml
über	40 kg	2 x täglich	8 ml

Jeder Teilstrich auf der Skala des Injektors entspricht ca. 1 ml.

Empfohlene Fütterungsdauer:

1 - 2 Wochen. Eine Verlängerung der Fütterungsdauer ist unbedenklich. Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Während der Gabe von **DiarPositiv® PRO** sollte reichlich Wasser zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung gestellt werden.

Aufgrund des erhöhten Gehaltes an Zusatzstoffen die empfohlene Fütterungsmenge nicht überschreiten.

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

Hinweise:

Stellung (linker Rand) auf die zu verabreichende Menge einstellen, um eine zu große Eingabemenge zu verhindern.

Nach Anbruch aufbrauchen. Nicht über 25°C lagern!

Haltbarkeit: 24 Monate

Handelsform: 30 ml Injektor