



# DiarPositiv® PRO

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen

Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms

MIT NATRIUM-BUTYRAT



**Butyrat** ist eine wichtige Energiequelle für Zellen der Darmschleimhaut und trägt zur Stärkung der Darmbarriere bei.

**Enterococcus faecium** ist ein probiotisches, Milchsäure produzierendes Bakterium, das als lebender Mikroorganismus zur Stabilisierung der Darmflora beiträgt.

**Präbiotische Fructo-Oligosaccharide** dienen als Nährstoffe für das Wachstum der erwünschten Mikroorganismen im Darm und tragen so zur Aufrechterhaltung einer gesunden Darmflora bei.

**Bentonit** ist ein Tonmineral mit starker Quellfähigkeit und hohem Wasserbindungsvermögen.



## Wesentliche ernährungsphysiologische Merkmale:

Hoher Elektrolytgehalt, leicht verdauliche Einzelfuttermittel (Hefen, Malz).

## Zusammensetzung:

Pflanzliche Öle und Fette, Malz, Fructo-Oligosaccharide 5 %, Hefenerzeugnisse, Natriumbutyrat 0,6 %, Mineralstoffe, Hefen, Natriumchlorid, Kaliumchlorid

## Analytische Bestandteile:

Rohprotein	1,5 %	Rohfaser	0,4 %
Rohfett	42 %	Rohasche	34,3 %
Natrium	0,9 %	Kalium	0,3 %

## Zusatzstoffe pro 1000 ml:

Darmflorastabilisator:

*Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 2 x 10<sup>11</sup> KBE

Technologische Zusatzstoffe:

Bentonit	304.000 mg
Natriumpropionat [1k281]	2.000 mg
Sorbinsäure [1a200]	3.000 mg

## Fütterungsempfehlung:

Bei und nach akutem Durchfall. Zur Verabreichung über das Futter oder direkt in das Maul.

Bei einem Gewicht

bis	5 kg	2 x täglich	1 ml
von	> 5 - 10 kg	2 x täglich	2 ml
von	> 10 - 25 kg	2 x täglich	4 ml
von	> 25 - 40 kg	2 x täglich	6 ml
über	40 kg	2 x täglich	8 ml

Jeder Teilstrich auf der Skala des Injektors entspricht ca. 1 ml.

## Empfohlene Fütterungsdauer:

1 - 2 Wochen. Eine Verlängerung der Fütterungsdauer ist unbedenklich. Es wird empfohlen, vor der Verfüterung den Rat eines Tierarztes einzuholen.

Während der Gabe von **DiarPositiv® PRO** sollte reichlich Wasser zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung gestellt werden.

Aufgrund des erhöhten Gehaltes an Zusatzstoffen die empfohlene Fütterungsmenge nicht überschreiten.

Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden.

## Hinweise:

Stellung (linker Rand) auf die zu verabreichende Menge einstellen, um eine zu große Eingabemenge zu verhindern.

Nach Anbruch aufbrauchen. Nicht über 25°C lagern!

**Haltbarkeit:** 24 Monate

**Handelsform:** 30 ml Injektor